

NOTAS BREVES

Cuatro nuevos registros de homópteros (Homoptera: Auchenorrhyncha) para Cuba

Four new reports of homopterous (Homoptera: Auchenorrhyncha) for Cuba

Marta M. Hidalgo-Gato y R. Rodríguez-León

Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, Carretera de Varona, km 3 '5, Capdevila, Ciudad de La Habana, Cuba.

Palabras claves: Auchenorrhyncha, nuevos registros, Cuba.

Key words: Auchenorrhyncha, new records, Cuba.

INTRODUCCIÓN

El estudio de los homópteros auquenorrincos en Cuba en la actualidad, no sólo está dirigido a especies que afectan a los cultivos, sino también a aquellos grupos de especies que habitan en ecosistemas naturales de áreas montañosas y cayerías del archipiélago (HIDALGO-GATO ET AL., 1998; HIDALGO-GATO Y RODRIGUEZ-LEON, 2000; RODRIGUEZ-LEON E HIDALGO-GATO; 2001).

Como resultado de los inventarios que se han venido realizando durante los años 2000-2003 en diferentes áreas montañosas de la localidad de Mil Cumbres, se da a conocer el registro de cuatro especies de Cicadellidae, ampliando así su distribución en la región del Caribe. Estos resultados se enmarcan en el proyecto "*Diversidad de Coleoptera, Homoptera, Diptera y Lepidoptera (Insecta) en zonas montañosas del Área Protegida Mil Cumbres, Pinar del Río*" dentro del Programa Ramal Científico-Técnico: "Sistemática y Colecciones Biológicas" y que ejecuta el Instituto de Ecología y Sistemática. Los ejemplares fueron depositados en las colecciones entomológicas del mismo Instituto.

RESULTADOS

Superfamilia CICADELLOIDEA

Familia CICADELLIDAE

Subfamilia TYPHLOCYBINAE

Typhlocybella maculata Caldwell y Martorell, 1950.

Referencias: CALDWELL Y MARTORELL, 1950.

Material examinado: Forneguera (22° 45'209''N; WO 83°20'56.3''W): dos machos y dos hembras (22-II-02), M H-Gato y M. Trujillo, vegetación herbácea.

Distribución: Cuba, Puerto Rico (localidad tipo).

Subfamilia DELTOCEPHALINAE

Schaphytopius fuliginosus (Osborn, 1926)

Referencias: CALDWELL Y MARTORELL, 1950; LINNAVUORI, 1959.

Material examinado: Pan de Guajaibón (22°46'947''N; 83°23''.110'W): un macho y una hembra (22-II-02), M. H-Gato y M. Trujillo; una hembra (14-III-02), I. Fernández y A. Daniel; Sierra Chiquita (22°46'947''N; 83°23'850''W): una hembra (15-III-02), M. H-Gato y A. Daniel; Forneguera (22°45'209''N; 83°20'56.3''W): una hembra (12-III-03), M. H-Gato y M. Domínguez, en vegetación herbácea.

Distribución: Cuba, Puerto Rico (localidad tipo), Islas Vieques, Costa Rica, Colombia y México.

Schaphytopius nigrinotus (Calwell y Martorell, 1950)

Referencias: CALDWELL Y MARTORELL, 1950; LINNAVUORI, 1959.

Material examinado: Sierra Chiquita (22°46'439''; 83°23'785''W): un macho (26-III-03), M. H-Gato y M. Domínguez, en bosque semideciduo.

Distribución: Cuba, Puerto Rico (localidad tipo).

Haldorus furcatus Caldwell y Martorell, 1950

Referencias: CALDWELL Y MARTORELL, 1950; LINNAVUORI, 1959.

Material examinado: Sierra Chiquita (22°46'389''W; 83°23'850''W): un macho y una hembra, M. H-Gato y M. Domínguez; dos hembras, E. Reyes y M. Olcha (20-III-03), en vegetación herbácea.

Distribución: Cuba, Puerto Rico (localidad tipo).

BIBLIOGRAFÍA

- HIDALGO-GATO, M. M. Y R. RODRIGUEZ-LEON. 2000. Los homópteros (Homoptera: Auchenorrhyncha) de la Cordillera de Guaniguanico, Cuba. *Brenesia* 54 : 51-60.
- HIDALGO-GATO, M. M., R. RODRIGUEZ-LEON Y L. F. DE ARMAS. 1998. Homópteros auquenorrincos (Homoptera: Auchenorrhyncha) de la Altiplanicie Sagua-Baracoa, provincia de Holguín. *Poeyana* 468 : 1-7.
- CALDWELL, J. S. Y L. F. MARTORELL. 1950. Review of the auchenorrhynchous Homoptera of Puerto Rico. Part. 2 Fulgoroidea except Kinnaridae. *Jour. Agr. Univ. Puerto Rico*, 43 (1) : 269 p.
- OSBORN, H. 1923. Neotropical Homoptera of the Carnegie Museum, Parts 1-2. *Ann. Carnegie Mus.*, 15, 8-26 & 27-79.
- RODRIGUEZ-LEON E HIDALGO-GATO, M. M. 2001. Homópteros auquenorrincos presentes en siete cayos del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Poeyana* 481-483 : 1-5.